



Provosoivat tekijät



Kohtausittaista



Ilmaantumisnopeus ja kesto



Jatkuvaa

Liitännäisoireet

Huimauksen aiheuttaja	Provosoiva tekijä	Imaantumisnopeus ja kesto	Liitännäisoireet	Tärkeät puuttuvat piirteet
Tasapainohieron äkillinen vajaatoiminta (vestibulaarineuroniitti)	Spontaani alku Pään liike pahentaa, huimaus jatkuu koko episodin ajan	Äkillinen vertigo (minuuteissa), kesto päivistä muutamaan viikkoon	Ei	Neurologiset paikallisoireet Kuulonalenema Tajunnanhäiriö
Hyvänlaatuinen asentohuimaus	Makuulle meno, ylösnousu, kumartuminen, kyljen kääntäminen aamulla ennen ylösnousua (Mutta: pidempään paikallaan ollessa ei huimaa)	Äkillinen sekunneissa alkava lyhyt alle minuutin kiertohuimaus	Ei	Neurologiset paikallisoireet ja löydökset Kuulonalenema Tajunnanhäiriö
Ortostaattinen hypotensio	Seisomaan nousu makuulta tai istuvasta asennosta (Mutta: ei makuulle meno, makuuasennossa kyljen kääntäminen)	Prekollapsituntemukset ylösnoustaessa, huippaa ja silmissä hämärtyy, kesto minuutista minuutteihin	Verenpaineen lasku (ortostatismi)	Neurologiset paikallislöydökset Kuulonalenema
TIA (transient ischemic attack)	Spontaani alku	Äkillinen vertigo, kesto 10-15 minuuttia (pysyvä jos seurauksena on infarkti)	Neurologiset aivorunko-, pikkuaivo-, tai pitkien ratojen oireet	Samanaikainen kuulonalenema ja vertigo
Menieren tauti	Spontaani alku Pään liike pahentaa, huimaus jatkuu koko episodin ajan	Äkillisesti (minuuteissa-tunneissa) kehittyvä vertigo, kesto muutamia päiviä (10 min - 2 vuorokautta)	Korvatuntemukset - paine, kuulon alenema, korvan soiminen	Neurologiset paikallisoireet ja löydökset Tajunnanhäiriö
Migreenihuimaus	Liike (fyysinen rasitus), ylösnousu, valo, ääni, hajut pahentavat sekä päänsärkyä että huimausta	Äkisti tai hiipien alkava kiertohuimaus, tasapainohäiriön tuntu tai presynkope-tuntemukset, kesto minuutista tunteihin ja päiviin	Migreenin päänsärky tai aura, yleinen aistiherkkyys (valolle, äänille, hajuille, liikkeelle)	Neurologiset paikallislöydökset Kuulonalenema

Ortostatismi: Verenpaineen lasku: $RR_{\text{maaten}} - RR_{\text{seisten}} : RR_{\text{systolinen}} > 20 \text{ mmHg}$ tai $RR_{\text{diastolinen}} > 10 \text{ mmHg}$

Aivorunko-oireet ja löydökset: Näkö-, kasvo- ja puheoireet (kaksoiskuvat, suuntaa vaihtava nystagmus, kasvojen tuntohäiriö, kasvohermoalvaus, puheen puuromaisuus - dysartria), pikkuaivo-oireet: epävarma leveäraiteinen kävely, liikkeiden hapuilu (ataksia) ja epätarkkuus, huono tasapaino, pitkien ratojen oireet: hemipareesi, tetrapareesi, toispuoleinen tuntohäiriö (hemisensorinen oire)