

Autonomisen hermoston häiriö hallitsee malignin neuroleptisyndrooman taudinkuvaa



DSM-IV-tautiluokituksen kriteerit pahanlaatuiselle neuroleptioireyhtymälle (American Psychiatric Association 1994).

- A. Neuroleptilääkityksen käyttöön liittyy lihasjäykkyyden kehittyminen ja lämmönnousu
- B. Vähintään kaksi seuraavista:
- hikoilu
 - nielemisvaikeudet
 - vapina
 - virtsanpidätysvaikeudet
 - Tajunnan heikkeneminen (lievästä sekavuudesta koomaan)
 - mutismi
 - takykardia
 - kohonnut tai epävakaata verenpaine
 - leukosytoosi
 - lihasvaurioihin viittaavat laboratorioarvot (seerumin suurentunut kreatiniinikinaasiarvo)
- C. Kohtien A ja B oireet eivät aiheudu toisesta lääkkeestä (esimerkiksi fensyklidiinistä) eivätkä neurologisesta tai muusta sairaudesta (esimerkiksi virusenkefaliitista).
- D. Kohtien A ja B oireet eivät selity psykiatrisella häiriöllä (esimerkiksi katatonisin oirein ilmenevällä mielialahäiriöllä)